# インフルエンザ・新型コロナウイルス　経過報告書（保護者等記入）

| | | |
|---|---|---|
| 診断名<br>※どちらかに ☑ | ☐ インフルエンザ | ☐ 新型コロナウイルス |
| 学年・組・氏名 | 年　　組　　児童生徒（園児）氏名 | |
| 症状が出た日<br>**※医療機関に確認する** | 令和　　年　　月　　日 （発症０日目） | |
| 出席停止の期間<br>**※学校（園）に確認する** | 令和　　年　　月　　日　から 以下に示す出席停止の期間を満たす日まで | |

**【出席停止の期間の基準】**
- **インフルエンザは、発症した後５日を経過（発症の翌日を１日目）かつ解熱した後２日（幼児にあっては３日）経過するまで。**
- **新型コロナウイルスは、発症した後５日を経過（発症の翌日を１日目）かつ症状軽快した後１日経過するまで。**

保護者から学校（園）へ伝えること（医師からの注意事項等）

インフルエンザ
新型コロナウイルス
【解熱の目安】
・解熱剤不使用時に朝夕連続して37.5℃未満であること

新型コロナウイルス
【症状軽快の目安】
・解熱剤不使用時に解熱
・安静時において激しい咳や持続する咳が消失
・息苦しさが消失
・咽頭痛が緩和
・倦怠感が緩和

● 平熱及び朝夕の体温を下表に記入し、折れ線グラフを作成してください。

● インフルエンザの場合
解熱した日の「日付」に〇を記載してください。

● 新型コロナウイルスの場合
症状軽快（解熱した日を含む）日の「日付」に〇を記載してください。

［注意］
熱が下がった後に、再び熱が上がる場合がありますので、朝夕（同じ日の朝と夕方、もしくは夕方と翌日の朝）2回連続して37.5℃未満になった日を、「解熱」した日として、その「日付」に〇を記載してください。

【平熱：　　.　　℃】

| | 症状が出た日 | | １日目 | | ２日目 | | ３日目 | | ４日目 | | ５日目 | | ６日目 | | ７日目 | | ８日目 | | ９日目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | ／ | | ／ | | ／ | | ／ | | ／ | | ／ | | ／ | | ／ | | ／ | | ／ | |
| 症状 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時間帯 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 体温 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| 40.0℃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39.0℃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.0℃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37.0℃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.0℃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※登校（登園）可能の判断については、裏面を参考にしてください。

【参考】インフルエンザ・新型コロナウイルス出席停止期間基準早見表（小・中学校、高等学校用）

・インフルエンザの出席停止期間は、「発症した後５日、かつ解熱した後２日経過するまで」
・新型コロナウイルスの出席停止期間は、「発症した後５日、かつ症状軽快した後１日経過するまで」

※下表の日付記入欄に発症日（０日目）から発症後９日目までの日付を記入し、
解熱日・症状軽快日と照らし合わせた上で登校可能日を確認してください。

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付記入欄 | | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| | | 発症日（０日目） | 発症後１日目 | 発症後２日目 | 発症後３日目 | 発症後４日目 | 発症後５日目 | 発症後６日目 | 発症後７日目 | 発症後８日目 | 発症後９日目 |
| A | **発症から１日目に解熱・症状軽快した場合**<br>⇓<br>*（発症後６日目から登校可能）* | インフルエンザ | 発熱 | 解熱 | 解熱後１日目 | 解熱後２日目 | 解熱後３日目 | 解熱後４日目 | — | — | — | — |
| | | 新型コロナ | 有症状（発熱含） | 症状軽快（解熱含） | 軽快後１日目 | 軽快後２日目 | 軽快後３日目 | 軽快後４日目 | — | — | — | — |
| | | | 出席停止 | | | | | | 登校可能 | | | |
| B | **発症から２日目に解熱・症状軽快した場合**<br>⇓<br>*（発症後６日目から登校可能）* | インフルエンザ | 発熱 | → | 解熱 | 解熱後１日目 | 解熱後２日目 | 解熱後３日目 | — | — | — | — |
| | | 新型コロナ | 有症状（発熱含） | → | 症状軽快（解熱含） | 軽快後１日目 | 軽快後２日目 | 軽快後３日目 | — | — | — | — |
| | | | 出席停止 | | | | | | 登校可能 | | | |
| C | **発症から３日目に解熱・症状軽快した場合**<br>⇓<br>*（発症後６日目から登校可能）* | インフルエンザ | 発熱 | → | → | 解熱 | 解熱後１日目 | 解熱後２日目 | — | — | — | — |
| | | 新型コロナ | 有症状（発熱含） | → | → | 症状軽快（解熱含） | 軽快後１日目 | 軽快後２日目 | — | — | — | — |
| | | | 出席停止 | | | | | | 登校可能 | | | |
| D | **発症から４日目に解熱・症状軽快した場合**<br>⇓<br>*（インフルエンザ発症後７日目から登校可能）*<br>*（新型コロナ発症後６日目から登校可能）* | インフルエンザ | 発熱 | → | → | → | 解熱 | 解熱後１日目 | 解熱後２日目 | — | — | — |
| | | | 出席停止 | | | | | | 登校可能 | | | |
| | | 新型コロナ | 有症状（発熱含） | → | → | → | 症状軽快（解熱含） | 軽快後１日目 | — | — | — | — |
| | | | 出席停止 | | | | | | 登校可能 | | | |
| E | **発症から５日目に解熱・症状軽快した場合**<br>⇓<br>*（インフルエンザ発症後８日目から登校可能）*<br>*（新型コロナ発症後７日目から登校可能）* | インフルエンザ | 発熱 | → | → | → | → | 解熱 | 解熱後１日目 | 解熱後２日目 | — | — |
| | | | 出席停止 | | | | | | | 登校可能 | | |
| | | 新型コロナ | 有症状（発熱含） | → | → | → | → | 症状軽快（解熱含） | 軽快後１日目 | — | — | — |
| | | | 出席停止 | | | | | | 登校可能 | | | |

浜松市立小・中学校、浜松市立高等学校　用

令和８年度～

【記入例】

# インフルエンザ・新型コロナウイルス　経過報告書（保護者等記入）

| | | |
|---|---|---|
| 診断名<br>※どちらかに ☑ | ☑ インフルエンザ | ☐ 新型コロナウイルス |
| 学年・組・氏名 | ３　年　３　組　　児童生徒（園児）氏名　浜松　太郎 | |
| 症状が出た日<br>**※医療機関に確認する** | 令和　８　年　４　月　10　日（発症０日目） | |
| 出席停止の期間<br>**※学校（園）に確認する** | 令和　８　年　４　月　10　日　から 以下に示す出席停止の期間を満たす日まで | |

診断された箇所に☑してください。

**【出席停止の期間の基準】**
- **インフルエンザは、発症した後５日経過（発症の翌日を１日目）かつ解熱した後２日（幼児にあっては３日）経過するまで。**
- **新型コロナウイルスは、発症した後５日を経過（発症の翌日を１日目）かつ症状軽快した後１日経過するまで。**

保護者から学校（園）へ伝えること（医師からの注意事項等）

インフルエンザ
新型コロナウイルス
【解熱の目安】
・解熱剤不使用時に朝夕連続して37.5℃未満であること

新型コロナウイルス
【症状軽快の目安】
・解熱剤不使用時に解熱
・安静時において激しい咳や持続する咳が消失
・息苦しさが消失
・咽頭痛が緩和
・倦怠感が緩和

● 平熱及び朝夕の体温を下表に記入し、折れ線グラフを作成してください。

● インフルエンザの場合
解熱した日の「日付」に〇を記載してください。


● 新型コロナウイルスの場合
症状軽快（解熱した日を含む）日の「日付」に〇を記載してください。

［注意］
熱が下がった後に、再び熱が上がる場合がありますので、朝夕（同じ日の朝と夕方、もしくは夕方と翌日の朝）2回連続して37.5℃未満になった日を、「解熱」した日として、その「日付」に〇を記載してください。

症状を記入してください。
発熱、咳　等

【平熱：３６.５　℃】

| | 症状が出た日 | | １日目 | | ２日目 | | ３日目 | | ４日目 | | ５日目 | | ６日目 | | ７日目 | | ８日目 | | ９日目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 4月10日 | | 4月11日 | | 4月12日 | | 4月13日 | | 4月14日 | | 4月15日 | | 4月16日 | | 4月17日 | | 4月18日 | | 4月19日 | |
| 症状 | 発熱、咳 | | 発熱 | | 咳 | | 発熱 | | なし | | なし | | なし | | なし | | なし | | なし | |
| 時間帯 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 体温 | 39.2℃ | 39.5℃ | 38.5℃ | 38.0℃ | 37.3℃ | 37.9℃ | 38.0℃ | 38.5℃ | 37.4℃ | 37.2℃ | 37.0℃ | 36.8℃ | 36.5℃ | 36.5℃ | 36.3℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | 36.5℃ |




**※登校（登園）可能の判断については、裏面を参考にしてください。**